



2016年6月13日

各位

会社名



(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 執行役員 社長室長 東 満之

TEL 076-442-7026

オランザピン錠 2.5mg/錠 5mg/錠 10mg 「日医工」

オランザピンOD錠 5mg/OD錠 10mg 「日医工」

オランザピン細粒 1% 「日医工」

効能・効果及び用法・用量の追加のお知らせ

日医工株式会社は、平成28年6月1日、オランザピン錠 2.5mg/錠 5mg/錠 10mg 「日医工」・オランザピンOD錠 5mg/10mg 「日医工」・オランザピン細粒 1% 「日医工」につきまして、下記の通り、効能・効果および用法・用量の追加に関する製造販売承認事項一部変更承認を取得しましたのでお知らせいたします。

これにより、発売開始時から先発品と同様に処方していただけるようになりました。

記

【効能・効果】

- ・統合失調症
- ・双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善

【用法・用量】

統合失調症：

通常、成人にはオランザピンとして5～10mgを1日1回経口投与により開始する。維持量として1日1回10mg経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1日量は20mgを超えないこと。

双極性障害における躁症状の改善：

通常、成人にはオランザピンとして10mgを1日1回経口投与により開始する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は20mgを超えないこと。

双極性障害におけるうつ症状の改善：

通常、成人にはオランザピンとして5mgを1日1回経口投与により開始し、その後1日1回10mgに増量する。なお、いずれも就寝前に投与することとし、年齢、症状に応じ適宜増減するが、1日量は20mgを超えないこと。

(下線部追加)

以 上