

先発品と適応症の異なる後発品のチェックリスト

本資料は”先発品と後発品で適応症の異なる薬剤”を「医薬品医療機器情報提供ホームページ」などを参考にして日医工MPSがまとめました。適応症名は一部省略しているものもあります。また調査漏れ、資料作成後の承認状況等により記載情報が変更になっている可能性もあります。本資料はチェック用の参考資料としてご利用いただき、必ず添付文書等でご確認ください。

[作成日：2008年7月8日]

分類 :先発品のみ備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が有るもの
分類 :先発品と一部の後発品が備考欄の「適応症」を有している医薬品	日医工品には適応症が無いもの
分類 :一部の後発品には備考欄の「適応症」を有しているが、先発品にはない医薬品	日医工には該当品が無いもの

一般名(あ順)		分類	先発品名	備考欄(適応症等)	日医工品名	
アスピリン	末	-	(区別なし)	川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)	日局アスピリン(オリエントル)	無
アズレンスルホン酸ナトリウム	細粒		アズノール	[細粒・顆粒のみ]含嗽(咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷)	(該当品なし)	
アモキシシリン	Cp		サワシリン、パセトシン	[ラベプラゾール(パリエット)との併用の場合] 胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	アモセパシンCp	無
アルプロスタジル	注射		バルクス、リブル	経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善	(該当品なし)	
イオバミドール(注のみ)	注		イオバミドール	用法のただし書、「なお、胸・腹部を高速らせんコンピューター断層撮影で撮像する場合は、撮影対象部位により静脈内投与速度を調節する。ただし、投与量は肝臓領域を除く胸・腹部の場合は100mLまでとするが、肝臓領域の場合は150mLまで投与することができる。」(後発品ではオイパロミンにあり)	モイオバミン	無
イコサベント酸エチル	Cp		エパデール	高脂血症	アンサチュールCp	有
イトラコナゾール	Cp・錠		イトリゾール	爪カンジダ症、カンジダ性爪囲爪炎	イトラコンCp、トラコナ錠	無
(塩酸)イミダプリル(2.5・5mg)	錠		タナトリル錠	[2.5mg、5mg]1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症	イミダプリル塩酸塩錠「TCK」	無
ウルソデオキシコール酸	錠		ウルソ	原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善、C型慢性肝疾患における肝機能の改善	シキコール錠	無
エビリゾール	錠		メブロン	慢性関節リウマチ	(該当品なし)	
オフロキサシン	錠		タリビット	らい菌(ハンセン病)	(該当品なし)	
オメプラゾール (10mg、20mg)	錠 10mg		オメプラール、オメプラゾン	胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 [10mg錠のみ]非びらん性胃食道逆流症	オメラップ錠	無
過テクネチウム酸Na()ジェネレータ			ウルトラテクネカウ	医療機器「テクネガス発生装置」との組合せ使用による局所肺換気機能の検査	(該当品なし)	
カルベジロール	錠		アーチスト	「虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全」でACE阻害薬、利尿剤、ジギタリス等を併用している場合	カルベジロール錠「タツミ」	無
(塩酸)グラニセトロン	注射		カイトリル	造血幹細胞移植前処置時の放射線全身照射(TBI)に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)	グラニセトロン静注用「日医工」	無
クラリスロマイシン (50mg錠、200mg錠、DS)	錠・DS		クラリス、クラリシッド	後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症 [200mg錠のみ]ラベプラゾール(パリエット)との併用におけるヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠、DS	無
(塩酸)クレムテロール	錠		スピロペント	腹圧性尿失禁	(該当品なし)	

先発品と適応症の異なる後発品のチェックリスト

作成:2008年7月8日

一般名(お順)		分類	先発品名	備考欄(適応症等)	日医工品名	
シクロスポリン	Cp		ネオラル	心移植・肺移植・膵移植における拒絶反応の抑制、全身型重症筋無力症	シクボラルCp	無
(塩酸)ジラゼブ	錠		コメリアンコーワ	腎機能障害軽度～中等度のIgA腎症における尿タンパク減少	スプラン錠	有
シロスタゾール	錠		ブレタル	脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制	シロスレート錠	無
テオフィリン徐放	顆粒		テオドルG20%	慢性気管支炎、肺気腫(スロービット顆粒にはある)	(該当品なし)	
テオフィリン(50mg)	錠		テオドル錠50mg	慢性気管支炎、肺気腫(テオロング錠50mgにはある)	(該当品なし)	
トラニラスト	錠・細粒		リザベン	ケロイド、肥厚性瘢痕	セキシードCp、トピアス細粒	有
トラネキサム酸	注射		トランサミン注	紅斑・腫脹・そう痒(湿疹およびその類症、蕁麻疹、中毒疹・薬疹)、咽頭痛・発赤・充血・腫脹(扁桃炎、咽喉頭炎)、口内炎における口内痛および口内粘膜アフター	トラカプミン注	有
(塩酸)トルペリゾン	錠		ムスカルムD	変形性脊椎症における筋緊張状態の改善	(該当品なし)	
ニコランジル	注射		シグマート	急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む)	(該当品なし)	
パミドロン酸二Na	注射		アレディア	乳癌の溶骨性骨転移	(該当品なし)	
(塩酸)バンコマイシン	注射		塩酸バンコマイシン	バンコマイシンに感性的ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)による敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎	バンマイシン点滴静注用	無
ピコスルファートナトリウム	液		ラキソベロン液	手術前における腸管内容物の排除(後発品にはある)	ベルベロン内用液	有
برانルカスト水和物	錠・Cp		オノン	アレルギー性鼻炎	برانルカストCp「日医工」	無
フロセミド(20mg)	注射		ラシックス注20mg	急性または慢性腎不全による乏尿(20mg注ではローブストン注のみにある)	ローブストン注20mg	有
プロピオン酸ベクロメタゾン	外用	-	プロパデルム、その他	外用用、吸入用(口腔、鼻腔)等の製剤により適応症が異なるので注意	(エスバタットAQ点鼻薬)	
(塩酸)プロプラノロール(日局)	錠		インデラル錠	「本態性高血圧症(軽症～中等症)」のシバリの有無 (「他の降圧剤で十分な効果が得られないか、または副作用などの発現により、他の降圧剤の投与が困難な際に使用する」とするシバリがアイデイトロールにはある)	ヘルツベース錠	有
(リン酸)ベタメタゾンNa	注射		リンデロン	椎間板ヘルニアの神経根炎、術後腹膜癒着防止、円形脱毛症、ケロイド(一部後発品にある)	(該当品なし)	
ヘパリン類似物質	ゲル		ヒルドイドゲル	痔核、「血栓性静脈炎(痔核を含む)」(後発品にはある = ピーソフテン、ホソイドン)	(該当品なし)	
ベラプロストナトリウム	錠		ドルナー、プロサイリン	原発性肺高血圧症	プロルナー錠、ベラドルリン錠	無
ラクツロース	散	-	モニラック散	産婦人科術後の排ガス・排便の促進、小児における便秘の改善(ラクツロース末Pには無い)	(該当品なし)	
ランソプラゾール	Cp		タケブロン	胃潰瘍又は十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 [15mgCpのみ]非びらん性胃食道逆流症	ランソラールCp	無
(酪酸)リボフラビン(20mg)	錠		ハイボン	・ビタミンB2欠乏症の予防及び治療 ・下記疾患のうち、ビタミンB2の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合 (口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎) ・ビタミンB2の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給	(該当品なし)	
(塩化)リゾチーム(10mg)	錠	-	レフトーゼ、ノイチーム	レフトーゼ系にある効能効果「歯槽膿漏症」、ノイチーム系には無い	(該当品なし)	