

報道関係者各位

ブロナンセリン錠 2mg/4mg/8mg 「日医工」
小児に関する用法及び用量追加のお知らせ

日医工株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：岩本 紳吾）は、ブロナンセリン錠 2mg/4mg/8mg 「日医工」につきまして、本日 7 月 23 日付で下記の通り、小児に関する「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたことをご知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能又は効果」、「用法及び用量」が同一となります。

弊社は、ジェネリック医薬品の普及のため先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう引き続き取り組んでまいります。

【用法及び用量】（下線部追加）

通常、成人にはブロナンセリンとして 1 回 4mg、1 日 2 回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として 1 日 8～16mg を 2 回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 24mg を超えないこと。

通常、小児にはブロナンセリンとして 1 回 2mg、1 日 2 回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として 1 日 8～16mg を 2 回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 16mg を超えないこと。