

報道関係者各位

リバーロキサバン OD錠 10mg／15mg「日医工」
成人における静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制、
小児における静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対する
効能又は効果、用法及び用量追加のお知らせ

日医工株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：岩本 紳吾）は、リバーロキサバン OD錠 10mg／15mg「日医工」につきまして、本日1月30日付で下記の通り、成人における静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制、小児における静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対する「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたことをお知らせいたします。

弊社は、ジェネリック医薬品の普及のため先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう引き続き取り組んでまいります。

【効能又は効果】（下線部追加）

成人

○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制

○静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制

小児

○静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制

【用法及び用量】（下線部追加）

〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉

通常、成人にはリバーロキサバンとして15mgを1日1回食後に経口投与する。なお、腎障害のある患者に対しては、腎機能の程度に応じて10mg1日1回に減量する。

〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉

成人

通常、成人には深部静脈血栓症又は肺血栓塞栓症発症後の初期3週間はリバーロキサバンとして15mgを1日2回食後に経口投与し、その後は15mgを1日1回食後に経口投与する。

小児

通常、体重30kg以上的小児にはリバーロキサバンとして15mgを1日1回食後に経口投与する。

報道関係者様お問い合わせ先
日医工株式会社 広報室
TEL 076-442-7026