



2018年12月12日

各 位

会 社 名  **日医工株式会社**  
NICH-IKO

(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 執行役員 社長室長 東 満之

TEL 076-442-7026

### リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」

#### 骨ペーজেット病に対する効能・効果および用法・用量の追加のお知らせ

日医工株式会社は、リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」につきまして、本日12月12日、下記の通り、骨ペーজেット病に対する「効能・効果」および「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能・効果」および「用法・用量」が同一となります。

当社はジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

#### 記

##### 【効能・効果】

骨粗鬆症、骨ペーজেット病

##### 【用法・用量】

###### ○骨粗鬆症の場合

通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして17.5mgを1週間に1回、起床時に十分量(約180mL)の水とともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

###### ○骨ペーজেット病の場合

通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして17.5mgを1日1回、起床時に十分量(約180mL)の水とともに8週間連日経口投与する。

なお、服用後少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

(下線部追加)

以 上