



2019年3月28日

各 位

会 社 名  **日医工株式会社**
NICHIIKO
(証券コード 4541 東証第1部)
代表者名 代表取締役社長 田村友一
お問合せ先 執行役員 社長室長 東 満之
TEL 076-442-7026

ポリコナゾール錠 50mg/200mg「日医工」小児に関する用法・用量の追加のお知らせ

日医工株式会社は、ポリコナゾール錠 50mg/200mg「日医工」につきまして、3月27日、下記の通り、小児に関する「用法・用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。これにより、先発医薬品と「用法・用量」が同一となります。

当社はジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能・効果」および「用法・用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

記

【用法・用量】

成人（体重 40kg 以上）

通常、ポリコナゾールとして初日は1回 300mg を1日2回、2日目以降は1回 150mg 又は1回 200mg を1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には、増量できるが、初日投与量の上限は1回 400mg1日2回、2日目以降投与量の上限は1回 300mg1日2回までとする。

成人（体重 40kg 未満）

通常、ポリコナゾールとして初日は1回 150mg を1日2回、2日目以降は1回 100mg を1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には2日目以降の投与量を1回 150mg1日2回まで増量できる。

小児（2歳以上 12歳未満及び12歳以上で体重 50kg 未満）

ポリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ポリコナゾールとして1回 9mg/kg を1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には 1mg/kg ずつ増量し、忍容性が不十分の場合には 1mg/kg ずつ減量する（最大投与量として 350mg を用いた場合は 50mg ずつ減量する）。ただし、1回 350mg1日2回を上限とする。

小児（12歳以上で体重50kg以上）

ポリコナゾール注射剤による投与を行った後、通常、ポリコナゾールとして1回200mgを1日2回食間に経口投与する。なお、患者の状態に応じて、又は効果不十分の場合には1回300mg1日2回まで増量できる。

（下線部追加）

以 上