

2022年9月21日

各 位

日医工株式会社

グラニセトロン静注液 1mg/3mg 「NIG」

グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「NIG」

グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 「NIG」

グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「NIG」

術後の消化器症状（悪心、嘔吐）に対する効能又は効果、用法及び用量追加のお知らせ

当社の子会社である日医工岐阜工場株式会社（本社：富山県富山市）は、グラニセトロン静注液 1mg/3mg 「NIG」、グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「NIG」、グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 「NIG」及びグラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「NIG」につきまして、本日9月21日、下記の通り、術後の消化器症状（悪心、嘔吐）に対する「効能又は効果」、「用法及び用量」の追加に係る承認を取得いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、先発医薬品と「効能又は効果」、「用法及び用量」が同一となります。

ジェネリック医薬品の普及のため、先発医薬品との「効能又は効果」、「用法及び用量」の違いを早期に解消し、患者様や医療関係者の皆様が安心してご使用いただけるよう取り組んでまいります。

## 記

## 【効能又は効果】（下線部追加）

- 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与及び放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）
- 術後の消化器症状（悪心、嘔吐）

## 【用法及び用量】（下線部追加）

- <抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）>  
（略）
- <放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）>  
（略）
- <術後の消化器症状（悪心、嘔吐）>  
通常、成人にはグラニセトロンとして1回 1mg を静注又は点滴静注する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1日 3mg までとする。

以 上

問い合わせ先

日医工株式会社 社長室 コーポレート・コミュニケーション部

TEL 076-442-7026