

適正使用に関するお願い

精神活動改善・パーキンソン症候群治療剤
抗A型インフルエンザウイルス剤

アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」 アマンタジン塩酸塩錠 100mg「日医工」

アマンタジン塩酸塩錠

製造販売元

日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、従来からご案内申し上げていますが、因果関係は不明であるものの、抗インフルエンザウイルス剤服用後に異常行動等の精神神経症状を発現した症例が報告されております。

小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応として、患者様・ご家族に対して以下の点をご説明くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

本剤によるインフルエンザに対する治療が開始された後は、

- ① “異常行動”の発現のおそれがあること
- ② 自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること
- ③ 高層階の住居においては、例えば、
 - ・ 玄関及び全ての窓の施錠を確実に行うこと（内鍵、補助錠がある場合はその活用を含む。）、
 - ・ ベランダに面していない部屋で療養を行わせること、
 - ・ 窓に格子のある部屋がある場合はその部屋で療養を行わせること、等、小児・未成年者が容易に住居外に飛び出ない保護対策を講じることを医療関係者から患者及び保護者に説明すること
- ④ 一戸建てに住んでいる場合は、例えば、③の内容のほか、出来る限り1階で療養を行わせること
- ⑤ また、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状があらわれるとの報告があるので、上記と同様の配慮が必要であること

なお、厚生労働省のホームページに「平成 29 年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」を開設し、以下の情報が掲載されておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

(平成 29 年度 今冬のインフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

(平成 29 年度 インフルエンザ Q & A)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

謹白