

2019 年 11 月

適 正 使 用 に 関 す る お 願 い

精神活動改善・パーキンソン症候群治療剤
抗 A 型インフルエンザウイルス剤

アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」

アマンタジン塩酸塩錠 100mg「日医工」

アマンタジン塩酸塩錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、従来からご案内申し上げていますが、インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類に関わらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。

小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応として、患者様・ご家族に対して次頁に記載の内容をご説明くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

なお、今年も厚生労働省のホームページに「今冬のインフルエンザ総合対策について」が開設される予定ですので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

異常行動については下記をご参照下さい。

(インフルエンザ罹患時の異常行動についての注意喚起資材)

<https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000377868.pdf>

謹白

※ 次頁にインフルエンザの患者さんへの注意喚起について記載しておりますので、ご参照下さい。



インフルエンザの患者さんへの注意喚起

異常行動による転落等の事故を防ぐためのお願い

- インフルエンザの患者さんでは、**抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず**、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。
- 異常行動は、**①就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも発現する)**
②発熱から2日間以内に発現することが多いことが知られています。

異常行動の例



- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする
- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

事故を防止するために

発熱から少なくとも2日間、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような具体的な対策を講じるよう、保護者の方にご説明ください。

