

使用上の注意改訂のお知らせ

前立腺肥大症の排尿障害改善剤

タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg「日医工」\*

タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「日医工」\*

タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.1mg「日医工」

タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社  
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

\*旧販売名：ウロスロールカプセル 0.1/ウロスロールカプセル 0.2

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( \_\_\_\_\_ : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻 度 不 明 (現行どおり)		頻 度 不 明 (略)
過 敏 症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹、 <u>多形紅斑</u>	過 敏 症 <sup>注)</sup>	そう痒感、発疹、蕁麻疹等
消 化 器	胃不快感、嘔気、嘔吐、口渇、便秘、胃重感、胃痛、食欲不振、下痢、嚥下障害	消 化 器	胃不快感、嘔気、嘔吐、口渇、便秘、胃重感、胃痛、食欲不振、下痢、嚥下障害
そ の 他	鼻閉、浮腫、尿失禁、咽頭灼焼感、全身倦怠感、味覚異常、女性化乳房、持続勃起症、射精障害、術中虹彩緊張低下症候群、 <u>霧視、視力障害、ほてり、熱感、灼熱感</u>	そ の 他	鼻閉、浮腫、尿失禁、咽頭灼焼感、全身倦怠感、味覚異常、女性化乳房、持続勃起症、射精障害、術中虹彩緊張低下症候群
注：投与を中止すること。		注：投与を中止すること。	

\* 改訂内容につきましては DSU No.216 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・タムスロシン塩酸塩製剤との因果関係が否定できない副作用発現症例の集積により、「副作用」の「その他の副作用」の項に多形紅斑、視力障害、熱感等を記載いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

[http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine\\_m\\_seihin.html](http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html)

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載致します。

