

医師または薬剤師のみなさまへ

腎機能が低下している患者さんへの ファムシクロビル錠「日医工」の 投与量減量について

腎機能が低下している患者さんや血液透析を受けている患者さんでは、投与間隔をあけて減量して投与いただく必要があります。

- ◆腎機能に応じたファムシクロビル錠「日医工」の減量の目安^(注)

クレアチニクリアランス (mL/min)	単純疱疹の治療	帯状疱疹の治療
≥60	1回250mgを1日3回	1回500mgを1日3回
40~59		1回500mgを1日2回
20~39	1回250mgを1日2回	1回500mgを1日1回
<20	1回250mgを1日1回	1回250mgを1日1回

注) 外国人における成績をもとに設定した。

- ◆血液透析患者さんには本剤250mgを透析直後に投与し、次回透析前に追加投与は行わないでください。

禁忌等を含む使用上の注意については添付文書をご参照ください。

患者さんへご指導いただく際に、1枚ずつはがしてご使用ください。



ファムシクロビル錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、単純疱疹と帯状疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑える抗ヘルペスウイルス剤です。
通常、単純疱疹、帯状疱疹の治療に用いられます。



服用する前に

- 血液透析を受けている方、腎臓が悪いと言われたことのある方はお薬の量の調節が必要な場合もありますので、必ず医師または薬剤師にお伝えください。
- 以前にこのお薬を服用してアレルギー症状が出たことのある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は必ず医師または薬剤師にお伝えください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

服用時の注意点

- 意識障害（気を失う、もうろう状態）などがあらわれることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合には、十分に注意してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、お薬の量を変えないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を服用してください。ただし、次の服用する時が近い場合は、次に服用する時に1回分を服用してください。
- 誤って多くを服用した場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

副作用について

●まれに下記のような症状があらわれることがあります。次のような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

- ◆意識がなくなる ◆考えがまとまらない
- ◆実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる
- ◆高熱、唇や口内のただれ ◆まぶたや眼の充血 ◆からだがだるい
- ◆からだのむくみ ◆尿量が減る ◆尿がない
- ◆脱力感 ◆筋肉の痛み ◆赤褐色尿



これらの症状以外でも、お薬を服用して体調がおかしいと感じられましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、姉妹、兄弟、友人など）に絶対に渡さないでください。
- 光と高温多湿を避けて保管してください。（光により変色することがあります。変色したものは服用しないでください。）
- 子供の手の届かない場所に保管してください。