

ファムシクロビル錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、単純疱疹と帯状疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑える抗ヘルペスウイルス剤です。

服用する前に必ずお読みください

- 次の方は、お薬の量の調節が必要な場合があります。必ず医師または薬剤師にお伝えください。
 - ・ 腎臓が悪いと言われたことのある方
 - ・ 透析を受けている方
- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せずに処方された医師に相談してください。

▶ 飲み方について

- 医師の指示通りに服用してください。

飲む量と回数は、症状などに合わせて医師が決めます。自己判断でお薬をやめたり、お薬の量をかえないでください。



再発性の単純疱疹(口唇ヘルペスまたは性器ヘルペス)の治療を受けられる方へ

次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状発現後すみやかに(6時間以内)お薬を服用してください。

- 痛み(チクチク・ヒリヒリ)
※ただし、性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)

これらは、単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。

- 医師の指示通りに服用してください。

☐ 2回服用するよう指示された場合

2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用してください。12時間後が就寝中となる場合は、6～18時間後の範囲で、就寝前または起床後に服用してください。

☐ 1回のみ服用するよう指示された場合

1回のみ服用し、決して2回目の服用はしないでください。

- 再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

▶ 服用に関する注意点

- 意識を失う、もうろう状態などになることがあります。**自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合には、十分に注意してください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

- 発熱
- 目の充血や口のただれ
- 尿が減る・出ない
- むくみ
- だるい
- 筋肉の痛み
- 尿が赤褐色になる
- 息苦しい
- 白目や皮ふが黄色くなる
- 腹痛・おう吐



この他にも、服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、光を避けて室温(1～30℃)で保管してください。光により変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- お薬は湿気を避けて保管してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。



この他にも気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。



日医工株式会社

NICHI-IKO