

ファムシクロビル錠250mg「日医工」 ブリスターカード

再発性の単純疱疹 (口唇ヘルペス・性器ヘルペス) の治療を受けられる方へ



次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状発現後すみやかに(6時間以内)お薬を服用してください。

- 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
※ただし、性器ヘルペスの排膿時の痛みは含まない。
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)

これらは単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。



- 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。
- 2回服用するように指示された場合
2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用してください。12時間後が就寝中となる場合は、6~18時間後の範囲で、就寝前または起床時に服用してください。
- 1回のみ服用するよう指示された場合
1回のみ服用し、決して2回目の服用はしないでください。

- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せずに処方された医師に相談してください。
- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐ医師または薬剤師に相談してください。
- 再発の初期症状発現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

▶ **お薬の保管に関する注意**

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温(1~30℃)で保管してください。光により変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

このほかにも気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。



ブリスターカードのセット方法

1 ★を内側に折り返し折り目をつけます。
ピンクの面に錠剤シートのアルミ面を上にして、8錠分※をはめ込みます

次のような再発の初期症状が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

●錠剤または錠剤の再服用が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

このほかにも別にご案内していることがありますが、医師または薬剤師にご相談ください。

※通常用法・用量の場合

2 ★を内側に折り返します。

次のような再発の初期症状が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

●錠剤または錠剤の再服用が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

このほかにも別にご案内していることがありますが、医師または薬剤師にご相談ください。

3 ★の上下の爪を切れ目に はめて内側に折ります。

次のような再発の初期症状が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

●錠剤または錠剤の再服用が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

このほかにも別にご案内していることがありますが、医師または薬剤師にご相談ください。

4 左面を内側に折り返します。

次のような再発の初期症状が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。

●錠剤または錠剤の再服用が認められた場合、症状発現後すみやかに（6時間以内）お薬を服用してください。

- 痛み（アザラシ）に似た（または）、性器へん入の痒みや腫れがあらはれない
- むずむずするような違和感
- かゆみ
- 尿の痛みや違和感（性器へん入の場合）

これらは早期治療の再開時に一般的にみられる症状です。

●医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□追加服用による追加の発症から1週間程度経過後に1回目の服用してください。2回目の服用は、追加服用が効果的な場合は、6～18時間後の服用で、錠剤または錠剤の再服用に服用しないでください。


このほかにも別にご案内していることがありますが、医師または薬剤師にご相談ください。

5 真ん中の切れ目に ツメをはめます。錠剤シートが固定されているかご確認ください。

ファムシクロビル錠 250mg「日医工」再発性の単純疱疹（口唇ヘルペス・性器ヘルペス）の治療を受けられる方へ

▼切り取ってお使いください

ファムシクロビル錠 250mg「日医工」再発性の単純疱疹（口唇ヘルペス・性器ヘルペス）の治療を受けられる方へ



使用期限




お薬は、いつも持ち歩きましょう。


お薬がなくなったら、再発に備えて、医療機関でお薬を処方してもらいましょう。



1回目 症状があらわれたら 6時間以内 すぐに服用



2回目 12時間あけて服用 ※許容範囲6～18時間後



▲切り取ってお使いください。