

本資料の情報に関する注意

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

安定性試験

(無包装状態)

スピロラクトン錠 25mg 「日医工」

無包装状態の安定性試験

スピロラクトン錠 25mg 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、40℃の保存条件において、性状は、3ヵ月後に特異な臭いがした。

25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験期間：2008/10/27～2009/2/26

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間			
		開始時	2週	1ヵ月	3ヵ月
性状 ＜白色～微黄白色の素錠で、わずかに特異な芳香と清涼感がある＞	GU2601	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤※2
溶出性 (%) n=6 ＜45分, 70%以上＞	GU2601	87.4～92.4	89.5～90.9	88.6～89.5	86.7～88.1
含量 (%) ※1 n=3 ＜93.0～107.0%＞	GU2601	98.1～100.0	98.6～101.0	97.6～99.2	102.0～102.8
(参考値) 硬度 (N) n=10	GU2601	60～74	68～79	58～74	67～79

※1：表示量に対する含有率 (%)

※2：特異な臭いがする

● 無包装 25°C・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間			
		開始時	2 週	1 ヶ月	3 ヶ月
性状 ＜白色～微黄白色の素錠で、わずかに特異な芳香と清涼感がある＞	GU2601	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤
溶出性 (%) n=6 ＜45 分, 70%以上＞	GU2601	87.4～92.4	89.7～91.6	89.1～90.7	87.5～89.6
含量 (%) * n=3 ＜93.0～107.0%＞	GU2601	98.1～100.0	100.2～102.2	101.1～103.1	102.8～103.7
(参考値) 硬度 (N) n=10	GU2601	60～74	37～79	34～41	35～39

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 室温・曝光量 120 万 Lx・hr [D65 光源・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	総曝光量			
		開始時	40 万 Lx・hr	80 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状 ＜白色～微黄白色の素錠で、わずかに特異な芳香と清涼感がある＞	GU2601	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤	白色～微黄白色の錠剤
溶出性 (%) n=6 ＜45 分, 70%以上＞	GU2601	87.4～92.4	87.1～88.4	86.3～88.2	84.0～88.5
含量 (%) * n=3 ＜93.0～107.0%＞	GU2601	98.1～100.0	100.4～100.6	99.5～99.8	99.0～100.9
(参考値) 硬度 (N) n=10	GU2601	60～74	66～82	69～82	66～77

※：表示量に対する含有率 (%)