

医師または薬剤師のみなさまへ

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される患者さんへお伝えください

本剤は素錠に3層のフィルム（溶出制御層、主薬層、遮光層を）コーティングした4層の構造の徐放剤です。外層の遮光層と主薬層は服用後数分で溶けますが、溶出制御層内（素錠部）の主薬は数時間以上かけて徐々に溶け出します。

つきましては、以下の事項を予め患者さんへお伝えいただきますようお願ひいたします。

- ①上記製剤特性のため患者さんの体調や体質により、排便が服用後数時間内であれば糞便中に錠剤の一部が排泄される可能性があること。
- ②服用中に、血圧コントロール不良によると思われる症状を感じた場合、医師または薬剤師に連絡すること。


～裏面もご覧ください～

- 患者さんにご指導いただく際に、台紙から1枚ずつはがしてご使用ください。




参考


ニフェジピンCR錠「日医工」の徐放構造



ニフェジピンCR錠「日医工」の徐放機構




服用直後



遮光層が溶解




主薬層が溶解し、
溶出制御層が露出



素錠部分が膨潤し
側面の溶出制御層
を押し上げる



溶出制御層が素錠
の上下にフタをした
状態で、素錠部の
主薬が溶出



素錠部分が溶解し
溶出制御層のフタ
部分が残る

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される方へ

- このお薬は1日1回～2回の服用で1日中効果が発揮されるように設計された錠剤です。服用すると錠剤の外側がすぐに溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶け出して効果を持続させます。割ったり砕いたりせず、そのまま嚥まずに服用してください。
- 体調（下痢など）により服用後短時間で排便された場合、まれに錠剤の一部が排出されることがあります。
- もし、服用期間中に血圧が下がらなかつたり、体調に異変を感じられましたら医師または薬剤師にその旨をお伝えください。
- まれにめまい等があらわれることがありますので、高所の作業や自動車の運転等は十分ご注意ください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬がありますので、他の病院を受診する場合や薬局でお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- 必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。また、グレープフルーツジュースに含まれる成分が、このお薬の作用を強めることができます。グレープフルーツジュースと一緒に服用しないでください。

