

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される方へ

- このお薬は1日1回～2回の服用で1日中効果が発揮されるように設計された錠剤です。服用すると錠剤の外側がすぐに溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶け出して効果を持続させます。割ったり砕いたりせず、そのまま噛まずに服用してください。
- 体調（下痢など）により服用後短時間で排便された場合、まれに錠剤の一部が排出されることがあります。
- もし、服用期間中に血圧が下がらなかったり、体調に異変を感じられましたら医師または薬剤師にその旨をお伝えください。
- まれにめまい等があらわれることがありますので、高所の作業や自動車の運転等は十分ご注意ください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬がありますので、他の病院を受診する場合や薬局でお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- 必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。また、グレープフルーツジュースに含まれる成分が、このお薬の作用を強めることがあります。グレープフルーツジュースと一緒に服用しないでください。

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される方へ

- このお薬は1日1回～2回の服用で1日中効果が発揮されるように設計された錠剤です。服用すると錠剤の外側がすぐに溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶け出して効果を持続させます。割ったり砕いたりせず、そのまま噛まずに服用してください。
- 体調（下痢など）により服用後短時間で排便された場合、まれに錠剤の一部が排出されることがあります。
- もし、服用期間中に血圧が下がらなかったり、体調に異変を感じられましたら医師または薬剤師にその旨をお伝えください。
- まれにめまい等があらわれることがありますので、高所の作業や自動車の運転等は十分ご注意ください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬がありますので、他の病院を受診する場合や薬局でお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- 必ず医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。また、グレープフルーツジュースに含まれる成分が、このお薬の作用を強めることがあります。グレープフルーツジュースと一緒に服用しないでください。