

使用上の注意改訂のお知らせ

胆汁排泄型持続性 AT₁ 受容体ブロッカー/利尿薬合剤

テルチア[®] 配合錠 AP「日医工」

テルチア[®] 配合錠 BP「日医工」

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド配合錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (----- : 自主改訂, ~~~~~ : 削除)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
代謝異常	<u>脂質異常症 (低比重リポ蛋白増加, トリグリセリド増加等), 低クロール性アルカローシス, 糖尿病のコントロール不良</u>	代謝異常	<u>高コレステロール血症, 低クロール性アルカローシス, 血清脂質増加, 糖尿病のコントロール不良</u>

*改訂内容につきましては DSU No.259 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- 従前より本剤投与による高コレステロール血症, 血清脂質増加について注意喚起して参りましたが, この度これらの事象を「脂質異常症 (低比重リポ蛋白増加, トリグリセリド増加等)」にまとめる記載整備を行うことといたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

