

使用上の注意改訂のお知らせ

高血圧症・狭心症・不整脈治療剤

本態性振戦治療剤

アロチノロール塩酸塩錠 5mg「日医工」

アロチノロール塩酸塩錠 10mg「日医工」

アロチノロール塩酸塩錠

製造販売元 日医工株式会社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ : 自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用			3. 相互作用		
併用注意(併用に注意すること)			併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(現行どおり)			(略)		
クラス I 抗不整脈剤 ジソピラミド, プロカインアミド, アジマリン等 <u>アミオダロン</u> <u>ソタロール</u>	過度の心機能抑制があらわれることがある。 減量するなど慎重に投与すること。	両剤の心機能抑制作用を相加的に増強する可能性がある。	クラス I 抗不整脈剤 ジソピラミド, プロカインアミド, アジマリン等	過度の心機能抑制があらわれることがある。 減量するなど慎重に投与すること。	両剤の心機能抑制作用を相加的に増強する可能性がある。
ジギタリス製剤	(現行どおり)	(現行どおり)	ジギタリス製剤	(略)	(略)
<u>フィンゴリモド</u>	<u>フィンゴリモドの投与開始時に併用すると徐脈が増強されることがある。</u>	<u>ともに徐脈を引き起こすおそれがある。</u>	← 記載なし		
非ステロイド性抗炎症剤	(現行どおり)	(現行どおり)	非ステロイド性抗炎症剤	(略)	(略)
(現行どおり)			(略)		

*改訂内容につきましては DSU No.220 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・アミオダロン製剤、ソタロール製剤、フィンゴリモド製剤の添付文書の「相互作用」の「併用注意」の項にβ遮断薬の記載があることから整合をとるため、「相互作用」の「併用注意」の項にアミオダロン、ソタロール、フィンゴリモドを追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.info.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

