

イコサペント酸エチル粒状カプセル「日医工」 を服用される方へ

このお薬は**血液中の脂質を低下させ、血小板の凝集を抑える作用により血液の流れを改善し、血管の弾力性を保つお薬**です。



イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」




イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」



イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

飲み方について

1. 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
2. 粒状のお薬です。開封時にお薬が飛び散らないように、「切り口」を上にするように袋を立てて開封してください。
3. 食事のすぐ後に嚥まずに服用してください。空腹時に服用するとお薬の吸収が悪くなります。
4. 袋の中にお薬を残さないように全て飲みきってください。
5. 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。




服用中の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

- 次の症状に気づいたら、**医師または薬剤師に相談してください。**



白目や皮膚が
黄色くなる

咳

発疹や
かゆみ

体が
だるい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

イコサペント酸エチル粒状カプセル「日医工」 を服用される方へ

このお薬は**血液中の脂質を低下させ、血小板の凝集を抑える作用により血液の流れを改善し、血管の弾力性を保つお薬**です。



イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「日医工」




イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」



イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

飲み方について

1. 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
2. 粒状のお薬です。開封時にお薬が飛び散らないように、「切り口」を上にするように袋を立てて開封してください。
3. 食事のすぐ後に嚥まずに服用してください。空腹時に服用するとお薬の吸収が悪くなります。
4. 袋の中にお薬を残さないように全て飲みきってください。
5. 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。




服用中の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

- 次の症状に気づいたら、**医師または薬剤師に相談してください。**



白目や皮膚が
黄色くなる

咳

発疹や
かゆみ

体が
だるい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。