

# スマトリプタン錠50mg「日医工」 を服用される方へ

このお薬は片頭痛の症状を抑えるお薬です。  
このお薬は頭痛がおこった時にのみ服用し、  
頭痛の予防に服用することは避けてください。



## 服用する前に

以下の方は必ず医師に相談してください。

- 以前にお薬を服用してかゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 脳に病気のある方 ● 心臓に病気のある方 ● 高血圧の方
- 末梢血管に病気のある方 ● 肝臓に病気のある方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方 ● 授乳中の方
- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬があります。他のお薬を服用している場合は必ず医師または薬剤師に伝えてください。また、他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 服用方法

- 1回1錠 **頭痛がおこったら**服用してください。
- コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。
- 効果が不十分な場合には、前の服用から2時間以上あけて1錠追加服用することができます。
- 1回1錠の服用で効果が不十分であった場合は、次回から1回2錠服用することができます。
- 1日に服用できる量は4錠までです。

## 服用時の注意

- このお薬を服用後に眠くなることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないよう注意してください。
- このお薬を服用しても症状が良くならない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
- 今までにない強い頭痛がおこった場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 副作用に関する注意

このお薬を服用中に次の症状に気づいた場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- 蕁麻疹・発疹
- 胸痛・胸部圧迫感
- 動悸
- 血圧上昇
- 息苦しい
- 吐き気・嘔吐
- めまい
- 視力の低下
- 視野狭窄
- 痛み
- 倦怠感
- 熱感

これら以外にも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 他のスマトリプタン製剤（注射薬・点鼻薬）使用に関する注意

- このお薬を服用後、他のスマトリプタン製剤（注射薬・点鼻薬）を使用する場合は、2時間以上間隔をあけてください。
- スマトリプタン注射薬を使用した後、このお薬を服用する場合は1時間以上間隔をあけてください。
- スマトリプタン点鼻薬を使用した後、このお薬を服用する場合は2時間以上間隔をあけてください。

## 薬の管理等における注意点

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。