

本資料の情報に関する注意

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

安定性試験

(無包装状態)

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「日医工」

無包装状態の安定性試験

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 10mg 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、曝光下の保存条件において、性状は開始時には淡いだいだい色で割線入りの素錠であり、総曝光量 40 万 Lx・hr 照射後に淡いだいだい色がわずかに黄色味を帯びた。

40℃、25℃・75%RH の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験期間：2014/9/9～2015/1/23

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	2 週	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状 n=10 ＜淡いだいだい色で割線入りの素錠＞	EP130	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠
崩壊試験 n=6 ＜90 秒以内＞	EP130	0'28"～0'34"	0'25"～0'32"	0'28"～0'31"	0'27"～0'31"	0'30"～0'32"
溶出性 (%) n=6 ＜15 分, 85%以上＞	EP130	97.4～103.3	98.8～102.7	100.0～102.0	99.0～101.0	96.4～100.7
含量 (%) * n=3 ＜95.0～105.0%＞	EP130	100.2～100.5	100.2～100.3	99.5～99.8	100.4～100.5	98.8～98.9
(参考値) 硬度 (N) n=10	EP130	70～79	62～78	69～74	69～74	71～80

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	2週	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状 n=10 ＜淡いだいだい色で割線入りの素錠＞	EP130	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色で割線入りの素錠
崩壊試験 n=6 ＜90秒以内＞	EP130	0'28"～0'34"	0'24"～0'29"	0'22"～0'24"	0'20"～0'23"	0'24"～0'25"
溶出性 (%) n=6 ＜15分, 85%以上＞	EP130	97.4～103.3	97.1～100.6	99.7～100.9	96.1～100.2	100.3～103.5
含量 (%) * n=3 ＜95.0～105.0%＞	EP130	100.2～100.5	100.0～100.3	99.5～99.7	100.5～100.8	98.8～98.9
(参考値) 硬度 (N) n=10	EP130	70～79	57～65	58～63	57～69	54～59

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 室温・曝光量 120万 Lx・hr [D65光源 (約 1600Lx)・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	総曝光量			
		開始時	40万 Lx・hr	80万 Lx・hr	120万 Lx・hr
性状 n=10 ＜淡いだいだい色で割線入りの素錠＞	EP130	淡いだいだい色で割線入りの素錠	淡いだいだい色がわずかに黄色味を帯びる	淡いだいだい色がわずかに黄色味を帯びる	淡いだいだい色がわずかに黄色味を帯びる
崩壊試験 n=6 ＜90秒以内＞	EP130	0'28"～0'34"	0'23"～0'27"	0'25"～0'28"	0'24"～0'27"
溶出性 (%) n=6 ＜15分, 85%以上＞	EP130	97.4～103.3	97.0～100.8	98.8～100.8	98.0～100.6
含量 (%) * n=3 ＜95.0～105.0%＞	EP130	100.2～100.5	98.9～99.3	98.5～98.7	98.0～98.5
(参考値) 硬度 (N) n=10	EP130	70～79	65～78	68～77	67～75

※：表示量に対する含有率 (%)