

クリアミン配合錠を 服用される方へ

このお薬は頭痛の発作を抑えるお薬です。
医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

クリアミン配合錠A1.0



1週間に最高10錠まで

クリアミン配合錠S0.5



1週間に最高20錠まで

以下の方は医師または薬剤師にご相談ください

- ・以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- ・末梢血管障害、閉塞性血管障害、狭心症、冠動脈硬化症、コントロール不十分な高血圧症、ショック、側頭動脈炎、肝障害、腎障害、敗血症、心臓弁膜の病変および既往がある方
- ・妊婦または妊娠している可能性がある方
- ・授乳中の方
- ・ほかに服用中のお薬がある方

服用上の注意事項

- ・めまいなどがあらわれることがあります。自動車の運転など、危険を伴う機械作業を行う際は、ご注意ください。
- ・その他いつもと違う症状が起きた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

裏面もご覧ください

他の診療科または病院・医院を受診した際に、
医師または薬剤師にお見せください。

医師、薬剤師の先生方へ

この患者さんは、頭痛治療剤「クリアミン配合錠」を服用中
です。次の薬剤との併用は**禁忌**となっておりますので、ご注意
ください。

- HIVプロテアーゼ阻害剤
 - リトナビル
 - ロピナビル・リトナビル
 - ネルフィナビル
 - ホスアンプレナビル
 - インジナビル
 - アタザナビル
 - サキナビル
 - ダルナビル
- エファビレンツ
- コビシスタット含有製剤
- マクロライド系抗生物質
 - エリスロマイシン
 - ジョサマイシン
 - クラリスロマイシン
 - ミデカマイシン
 - ロキシスロマイシン
- アゾール系抗真菌薬
 - イトラコナゾール
 - ミコナゾール
 - フルコナゾール
 - ホスフルコナゾール
 - ボリコナゾール
- テラプレビル
- オムビタスビル水和物・パリタプ
レビル水和物・リトナビル
- 5-HT_{1B/1D}受容体作動薬
 - スマトリプタン
 - ゾルミトリプタン
 - エレトリプタン
 - リザトリプタン
 - ナラトリプタン
- 麦角アルカロイド
 - ジヒドロエルゴタミン
 - エルゴメトリン
 - メチルエルゴメトリン

医療機関名