

クリアミン配合錠を 服用される方へ

このお薬は頭痛の発作を抑えるお薬です。

▶ 飲み方について

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。医師または薬剤師の指示通りに服用してください。頭痛がおこりそうなときや、頭痛がおきたときに、すぐに服用してください。

☐ クリアミン配合錠A1.0



1週間に最高10錠まで

☐ クリアミン配合錠S0.5



1週間に最高20錠まで

▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用すると、めまいなどがあらわれることがあります。**自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。**
- **禁煙してください。**このお薬の作用に影響します。
- このお薬には**一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります。**他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

このお薬の服用中に、食欲不振、悪心・おう吐があらわれる場合があります。この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

クリアミン配合錠を 服用される方へ

このお薬は頭痛の発作を抑えるお薬です。

▶ 飲み方について

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。医師または薬剤師の指示通りに服用してください。頭痛がおこりそうなときや、頭痛がおきたときに、すぐに服用してください。

☐ クリアミン配合錠A1.0



1週間に最高10錠まで

☐ クリアミン配合錠S0.5



1週間に最高20錠まで

▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用すると、めまいなどがあらわれることがあります。**自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。**
- **禁煙してください。**このお薬の作用に影響します。
- このお薬には**一緒に服用してはいけないお薬や、注意が必要なお薬があります。**他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

このお薬の服用中に、食欲不振、悪心・おう吐があらわれる場合があります。この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。