

使用上の注意改訂のお知らせ

抗乳癌剤

タモキシフェン錠 10mg「日医工」

タモキシフェン錠 20mg「日医工」

タモキシフェンクエン酸塩錠

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (----- : 自主改訂)

改 訂 後		現 行	
4. 副作用 (2) その他の副作用		4. 副作用 (2) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
皮 膚	発疹、発汗、脱毛、皮膚血管炎、皮膚エリテマトーデス、晩発性皮膚ポルフィリン症、 <u>放射線照射リコール反応等</u>	皮 膚	発疹、発汗、脱毛、皮膚血管炎、皮膚エリテマトーデス、晩発性皮膚ポルフィリン症等

*改訂内容につきましては DSU No.256 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・海外のタモキシフェンクエン酸塩製剤の添付文書において「放射線照射リコール反応」について記載されていることから、本邦におきましても「副作用」の「その他の副作用」の項に「放射線照射リコール反応」を追記することといたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。

