

ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、**片頭痛の症状を抑えるお薬**です。

▶ 飲み方について

- ① 片頭痛がおこった時に服用してください。**片頭痛の予防や片頭痛以外の頭痛には服用しない**でください。
- ② 1回および1日に飲む量は、医師又は薬剤師の指示を守ってください。(このお薬は最大で1回2錠、1日4錠までです。)
- ③ 1日に2回服用する場合は、**前回飲んでから2時間以上あけてください。**
- ④ このお薬は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ、軽くつぶしてからだ液と一緒に飲み込んでください。**ただし、水なしの場合には寝たまま服用しないでください。**

▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用しても症状が良くならない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 「いつもの片頭痛とは違う頭痛」の場合は、服用せずに医師または薬剤師に相談してください。

- このお薬の服用後に眠くなることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬や注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



胸の痛みや圧迫感



冷や汗



動悸



めまい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

ゾルミトリプタンOD錠 2.5mg「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、**片頭痛の症状を抑えるお薬**です。

▶ 飲み方について

- ① 片頭痛がおこった時に服用してください。**片頭痛の予防や片頭痛以外の頭痛には服用しない**でください。
- ② 1回および1日に飲む量は、医師又は薬剤師の指示を守ってください。(このお薬は最大で1回2錠、1日4錠までです。)
- ③ 1日に2回服用する場合は、**前回飲んでから2時間以上あけてください。**
- ④ このお薬は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ、軽くつぶしてからだ液と一緒に飲み込んでください。**ただし、水なしの場合には寝たまま服用しないでください。**

▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用しても症状が良くならない場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 「いつもの片頭痛とは違う頭痛」の場合は、服用せずに医師または薬剤師に相談してください。

- このお薬の服用後に眠くなることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬や注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



胸の痛みや圧迫感



冷や汗



動悸



めまい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。