

# 日医工の アナストロゾール錠 を服用される方へ

このお薬は、閉経後の乳がんの治療に  
使用されるお薬です。

## ▶飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。



## ▶服用中の注意点

- このお薬を服用すると骨からカルシウムが失われ、骨粗鬆症こつ そしょうしょうが起こりやすくなります。定期的に骨密度の検査を受けるようにしてください。
- このお薬の服用中に、力が入りにくくなったり、うとうとするなどの症状があらわれることがあります。自動車自動車の運転などの危険を伴う機械を操作する場合は十分注意してください。



## ▶副作用について

このお薬の服用中に次の症状に気づいた場合には、**主治医または薬剤師に連絡してください。**



- 関節の痛みやこわばり



- ほてり



- 頭痛



- 吐き気



- 性器出血

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

## ▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



日医工株式会社

NICHIKO