

クエチアピン錠「日医工」 クエチアピン錠/細粒「EE」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経伝達のバランスを整えるお薬です。

クエチアピン錠「日医工」

錠25mg



錠100mg



錠200mg



クエチアピン錠/細粒「EE」

錠25mg



錠50mg



錠100mg



錠200mg



細粒50%



このお薬を服用される際は、次の点に十分ご注意ください。

- このお薬の服用中に血糖値の上昇や低下が起こることがありますので、服用中は定期的に血糖値の測定を行う場合があります。
- 次の人はこのお薬を服用することができません。必ず医師または薬剤師に相談してください。
 - ・糖尿病の方、または過去に糖尿病と診断された方
 - ・過去にクエチアピン錠「日医工」、クエチアピン錠/細粒「EE」に含まれる成分でアレルギーなどの過敏症のあった方
- 次の人は慎重に服用する必要がありますので、医師または薬剤師に相談してください。
 - ・ご家族に糖尿病の方がいる方、血糖値が高い方、肥満傾向の方
 - ・肝臓・心臓・血管に病気のある方、脳血管障害の方、低血圧の方、またはこれらの疑いのある方
 - ・てんかんなどけいれんを起こす病気のある方、または過去に起こしたことのある方
 - ・不整脈の方、または過去に不整脈のある方、先天性QT延長症候群の方、またはQT延長を起こすことが知られている薬剤を使用している方
 - ・死にたいと強く思ったり考えたりしたことのある方
 - ・妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方

- このお薬には一緒に使用してはいけないお薬や、注意すべきお薬があります。他にお薬を使用している場合や他の病院を受診する場合、薬局で他のお薬を購入する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。また、アルコールは控えてください。
- このお薬は医師の指示なしで服用を中止したり、量を調整すると、病気が悪化することがあります。必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 眠気、注意力・集中力の低下などが起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。


このお薬の服用中に次のような症状があらわれた場合、またはご家族が症状に気づかれた場合は、**すぐに服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。**



激しい
のどの渇き



水やお茶などを
たくさん飲む



何度も
トイレに行く



尿の量が
多い



体に力が
入らない



冷や汗が
出る



手足が
ふるえる



意識が
はっきりしない

これら以外にも体重の増加や立ちくらみ、めまいなどがあらわれることがありますので、気になる症状があらわれた場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人など）に絶対に渡さないでください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。