

使用上の注意改訂のお知らせ

徐放性不整脈治療剤

ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg「日医工」

〈ジソピラミドリン酸塩徐放錠〉

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

＜新旧対照表＞（ ：自主改訂）

改 訂 後			現 行		
【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1. ～4. : 現行どおり 5. スパルフロキサシン、モキシフロキサシン塩酸塩、トレミフェンクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、アミオダロン塩酸塩（注射剤）、 <u>エリグルスタット酒石酸塩</u> 又はフィンゴリモド塩酸塩を投与中の患者（「3. 相互作用」(1) の項参照） 6. ～7. : 現行どおり			【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 1. ～4. : 略 5. スパルフロキサシン、モキシフロキサシン塩酸塩、トレミフェンクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、アミオダロン塩酸塩（注射剤）又はフィンゴリモド塩酸塩を投与中の患者（「3. 相互作用」(1) の項参照） 6. ～7. : 略		
3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）			3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等 (現行どおり)	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等 (略)	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アミオダロン塩酸塩（注射剤） アンカロン注	(現行どおり)	併用により QT 延長作用が相加的に増強すると考えられる。	アミオダロン塩酸塩（注射剤） アンカロン注	(略)	併用により QT 延長作用が相加的に増強すると考えられる。
<u>エリグルスタット酒石酸塩</u> <u>サデルガ</u>	<u>併用により QT 延長等を生じるおそれがある。</u>				
フィンゴリモド塩酸塩 イムセラ ジレニア	(現行どおり)	(現行どおり)	フィンゴリモド塩酸塩 イムセラ ジレニア	(略)	(略)

＜改訂理由＞

- エリグルスタット酒石酸塩製剤（商品名：サデルガ）の「使用上の注意」において、「クラス Ia 抗不整脈薬」が「併用禁忌」とされていることから、整合をとるため、本剤においても「エリグルスタット酒石酸塩」を「併用禁忌」といたしました。

* 改訂内容につきましては DSU No.246 に掲載の予定です。

なお、改訂後の添付文書は日医工ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載致します。