

レトロゾール錠「日医工」 レトロゾール錠「EE」 を服用される方へ

レトロゾール錠2.5mg「日医工」

レトロゾール錠2.5mg「EE」



▶服用前の注意点

- 次の方はお薬を服用する前に主治医または薬剤師に相談してください。
 - ・以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
 - ・妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
 - ・肝臓や腎臓に病気のある方
 - ・他にお薬を服用されている方
- 必ず主治医または薬剤師の指示どおりに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- 飲み忘れた場合は、気づいた時に服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は主治医または薬剤師に相談してください。

▶服用中の注意点


- 疲れやめまい、眠気があらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する際には十分気をつけてください。
- このお薬を服用することで、定期的に骨密度の検査をすることがあります。
- 他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用の注意点

次のような症状があらわれたら、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。



突然の意識の低下



しめ付けられるような
胸の痛み



息苦しい



疲れやすい



白目が黄色くなる



破れやすい水ぶくれ
が多発

これら以外にも気になる症状がありましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人(親、兄弟、姉妹、友人など)に絶対に渡さないでください。
- お薬が残った場合の廃棄については、受け取った薬局や医療機関に相談してください。