


ドネペジル塩酸塩錠/OD錠「日医工」 を服用される方、ご家族・介護者の方へ

このお薬は、
アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症の
認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。
- 飲み忘れに気付いても、決して**2回分を一度に服用しない**でください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませて軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、**水なしの場合には寝たままで服用しない**でください。

服薬スケジュール 1日1回服用してください。

	1週間	2週間	3週間	4週間以上経過後
アルツハイマー型 認知症の場合	3mg 	3mg  または 5mg 	5mg 	5mg 
アルツハイマー型 認知症で症状が 進行した場合 レビー小体型 認知症の場合	3mg 	3mg  または 5mg 	5mg 	10mg 

※症状によってお薬の量が変わることがあります。

▶服用中の注意点


- このお薬を服用すると、気を失う等の意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがあります。**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用について

- 次の症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。



食欲不振

吐き気

下痢

腹痛

- この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶保管等に関する注意点

- お薬はできるだけご家族や介護者の方が管理するようにしてください。
- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



日医工株式会社

NICHIKO