

# 日医工の シロスタゾール錠/OD錠 を服用される方へ

このお薬は、のうこうそく 脳梗塞の再発防止や

まんせいどうみやくへいそくしょう

慢性動脈閉塞症の症状を改善するためのお薬です。

## ▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。このお薬の作用が強くなる恐れがあります。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

## ▶ 服用中の注意点

- このお薬を服用すると、血管が広がって血液の流れが良くなることで一時的に頭痛や動悸ずつう どうきがあらわれることがあります。もし、これらの症状が続く場合は、  医師または薬剤師に連絡してください。

- 次の場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



- ・ 歯の治療、手術や内視鏡検査などを受ける場合（血が止まりにくくなる場合があります）
- ・ 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合（一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります）

## ▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。



苦しいほどの  
胸の痛みや動悸



がまんできない  
ほどの頭痛



意識が  
もうろうとする



鼻血が出たり、  
あざがでやすくなる



気分が悪い、  
吐き気がする



熱が出たり、  
咳が出たりする

この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

## ▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。