

リバステグミンテープ「日医工」

を使用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬はアルツハイマー型認知症の認知症症状の進行を遅らせるお薬です。
皮膚から有効成分が吸収されるテープ剤で、24時間作用が持続します。

▶ お薬の使用スケジュール

通常は右のスケジュールに沿って**1日1枚**使用します。

スケジュール	1週～4週	5週～8週	9週～12週	13週～
使用量 (規格)	4.5mg リバステグミン /	9mg リバステグミン 日医工 (/)	13.5mg リバステグミン 日医工 (/)	18mg リバステグミン 日医工 (/)
個包装の色	桃色	だいたい色	黄緑色	紫色

※テープの表面には日付を記入することができます。

※※状態によっては9mgから開始し、5週目から18mgを使用することもあります。

*テープのサイズは実物大ではありません。

▶ 使用前の注意点

次の方は主治医または薬剤師に相談してください。

- 以前にお薬を使用して発疹やかゆみが出たことのある方
- 心臓や肝臓に病気のある方
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍のある方、または過去に経験したことのある方
- 非ステロイド性消炎鎮痛剤を使用している方
- 尿路閉塞のある方、またはなりやすい方
- 他にお薬を使用している方
- てんかん等けいれんを起こす方、または起こしたことのある方
- 気管支喘息や肺に病気のある方、または過去に経験したことのある方
- パーキンソン病など錐体外路障害のある方
- 妊娠又は妊娠している可能性のある方、授乳中の方


▶ 使用方法

お薬を貼る場所や貼る時の注意点


- 右図のように背中、上腕と胸のいずれか**1か所**に貼ってください。
- 傷や皮膚病のある場所は避け、**正常な皮膚**に貼ってください。
- 清潔で乾燥した場所、体毛が少ない場所、密着した衣類を着用してもこすれにくい場所に貼ってください。
- 1日1回ほぼ同じ時間に貼りかえてください。
- 前回とは異なる離れた場所に貼ってください。
- 一度に2枚以上を貼らないように、前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼ってください。
- クリームやローション、パウダー、オイルが塗られていない場所、テープが良く貼れる場所に貼ってください。
- 入浴後に貼る場合は、十分に水分を拭き取って、乾いてから貼ってください。

リバステグミンテープ「日医工」を貼る場所

背中




上腕と胸




お薬の貼り方

● 包装から取り出す




内部のテープを傷つけないように手またはハサミで包装を切り、テープを取り出してください。

● 透明シートをはがす




テープには透明シートがついています。使用時には粘着面に触れないように、はがしてください。

● お薬を貼る



粘着面を背中、上腕、胸のいずれかにあて、透明シートをはがしてください。


● お薬を押さえる



テープを手でしっかりと押さえ、はがれないようにしっかりと貼りつけてください。

使い終わったお薬の捨て方

- ゆっくりと優しく皮膚から完全にはがしてください。
- はがしたテープは、まだ薬の成分が残っているので接着面を内側にして半分に折り込んでください。必ず、子供の手や目の届かない所に廃棄してください。
- テープをはがした後は、手を目に触れず、石けんを使って手を洗ってください。



使用中の注意点

- このお薬は、自己判断で使用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりすると、病気が悪化することや副作用が出やすくなる場合があります。必ず主治医または薬剤師の指示どおりに使用を続けてください。
- 貼り忘れに気づいたときは、そのときに貼ってください。翌日からはいつもと同じ時間に貼りかえてください。貼りかえていないことに気づいた場合でも、決して一度に2回分を貼らないでください。
- 貼ったお薬がはがれたときは、その時点で新しいお薬に貼りかえ、翌日からはいつもと同じ時間に貼りかえてください。はがれたお薬は安全に廃棄してください。
- このお薬を使い始めたときや量を増やしたときにめまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転など、危険をともなう機械の操作はしないでください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用の注意点

このお薬を使用中に次の症状に気づいた場合には、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。




- 貼った場所のかゆみ・赤く腫れるなど




- 体重減少



- 嘔吐・下痢



- めまい・息切れ




- しめ付けられるような胸の痛み



- 腹痛



- 体がだるい



- 意識の低下

これらの症状以外にも気になることがあれば主治医または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- 貼る直前まで包装を開封しないでください。
- 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬は使用されている方だけに処方されたお薬です。他の人（親、兄弟、姉妹、友人等）に絶対に譲らないでください。