

アミノバクト配合顆粒を 服用される方へ



アミノバクト配合顆粒は、必須アミノ酸のうち、イソロイシン、ロイシン、バリンの3つの分岐鎖アミノ酸からできています。

肝臓病の方の血中アルブミン量を上昇させ、栄養状態を改善し、疲れやすさやだるさ、腹水などの症状を改善します。

通常、食事が十分摂れているにもかかわらず、血中アルブミン量が低い方に用いられます。

服用方法

- 通常、成人は1回1包1日3回食後に、医師の指示通りに服用してください。
- 服用する場合は、コップ1杯の水またはぬるま湯で服用してください。
- この薬は水に溶けにくいので、水に溶かして服用しないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回分飛ばしてください。2回分を一度に服用しないでください。
- 自分の判断で服用を止めないでください。

服用のポイント

- まず、水またはぬるま湯で口の中をぬらします。
- 1包の量が多いので、1回に服用できる量(1/3程度)を舌の上へのせ水またはぬるま湯で服用します。
- 残りを同じように服用します。
- 服用しづらいと感じた時は、オブラートを使って服用することもできます。



服用前の確認

- 次のような方は服用する前に医師に相談してください。
 - ・以前に薬でかゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
 - ・アミノ酸の代謝に異常があるといわれたことのある方
 - ・たんぱく質の摂取を制限している方
- 妊娠している方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- 他の薬を服用されている方(薬局で買った薬を含めて)


高齢の方は注意して服用してください。





副作用について


以下のような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。


- 下痢・便秘



- 口のかわき



- おなかが張ったような感じ



- 発疹・かゆみ



- 腹痛



- からだがだるい


- 吐き気・嘔吐


- 顔や足がむくむ


- 食欲がない・胸やけ・げっぷが出る


- 皮膚が赤くなる・ほてり



その他、いつもと違う症状が出たら、医師または薬剤師に相談してください。