

# 安定性試験

## (加速試験)

免疫抑制剤  
**シクロスポリンカプセル 25mg 「日医工」**  
 シクロスポリン

### 1. 加速試験

本品につき加速試験（40℃，75%RH，6ヵ月）を行った結果，シクロスポリンカプセル 25mg 「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

●保存包装：PTP 包装（最終包装形態）

保存条件：加速試験（40℃，75%RH）

測定項目：性状，確認試験，純度試験，崩壊試験，定量試験

測定時期：開始時，1，3，6ヵ月

ロット番号：CIC25C-1，CIC25C-2，CIC25C-3

（最小値～最大値）

測定項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間			
		開始時	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月
性状 ＜白色～淡黄白色の光沢のある軟カプセル剤で，特異なおいがある。内容物は無色～微黄色澄明の油状の液で粘性があり，特異なおいがある＞	CIC25C-1 CIC25C-2 CIC25C-3	適合	同左	同左	同左
確認試験 (薄層クロマトグラフィー)	CIC25C-1 CIC25C-2 CIC25C-3	適合	同左	同左	同左
純度試験 (HPLC) ＜※1＞	CIC25C-1 CIC25C-2 CIC25C-3	適合	—	—	適合
崩壊試験 (分) ＜20分以内＞	CIC25C-1 CIC25C-2 CIC25C-3	8～13 8～12 9～12	9～12 9～11 8～11	8～11 8～11 9～11	8～13 10～13 8～13
含量 (%) ※2 ＜95.0～105.0%＞	CIC25C-1 CIC25C-2 CIC25C-3	97.6～98.5 97.8～98.2 98.3～98.5	97.4～97.6 97.2～97.8 97.2～97.4	96.9～98.3 96.6～98.6 97.3～98.5	96.1～97.4 96.9～98.1 97.3～98.0

※1：RRT 約 0.3；0.7%以下，RRT 約 0.6；0.7%以下，シクロスポリン以外のそれぞれのピーク面積；1.5%以下

※2：表示量に対する含有率 (%)