



▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。



- 服用直前までお薬の包装のまま保管してください。

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



シクロスポリン カプセル「日医工」 を服用される方へ


このお薬は免疫抑制剤と呼ばれ
体内の免疫反応を抑えます。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用量を加減したり、やめたりしないでください。




- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。




▶ 服用中の注意点


- 副作用を防ぐために検査が行われます。受診日を守ってください。



- このお薬の服用中は、グレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品を控えてください。このお薬の効果に影響します。



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



- ワクチンの**予防接種**について主治医に相談してください。

- かぜなどの感染症にかかりやすくなることがあります。できるだけ人混みを避けてください。帰宅したら手洗いやうがい、消毒をしてください。



▶ 副作用について

むくみ、体がだるい、血圧が高くなるなど、この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

