

使用上の注意改訂のお知らせ

速効型食後血糖降下剤

日本薬局方 ナテグリニド錠

ナテグリニド錠30mg 「日医工」

ナテグリニド錠90mg 「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社
富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいませようお願い申し上げます。

<改訂内容> (-----:自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
インスリン製剤 ビグアナイド系薬剤 メトホルミン塩 酸塩等 α-グルコシダーゼ 阻害剤 アカルボース、ボ グリボース等 チアゾリジン系薬剤 ピオグリタゾン 塩酸塩 DPP-4 阻害剤 シタグリブチン リン酸塩水和物 等 GLP-1 受容体作動 薬 リラグルチド等 <u>SGLT2 阻害剤</u> <u>イブラグリフロ ジン L-プロリン 等</u>	低血糖症状（空腹感、 あくび、悪心、無気 力、だるさ等の初期 症状から血圧上昇、 発汗、ふるえ、顔面 蒼白等の症状を経て 意識消失、けいれん、 昏睡にいたる）、血糖 降下作用が増強され ることがあるので、 血糖値モニターそ の他患者の状態を十 分に観察し、必要で あれば減量する。	作用機序が異 なる薬理作用 の相加作用に よる血糖降下 作用の増強に よる。	インスリン製剤 ビグアナイド系薬剤 メトホルミン塩 酸塩等 α-グルコシダーゼ 阻害剤 アカルボース、ボ グリボース等 チアゾリジン系薬剤 ピオグリタゾン 塩酸塩 DPP-4 阻害剤 シタグリブチン リン酸塩水和物 等 GLP-1 受容体作動 薬 リラグルチド等	低血糖症状（空腹感、 あくび、悪心、無気 力、だるさ等の初期 症状から血圧上昇、 発汗、ふるえ、顔面 蒼白等の症状を経て 意識消失、けいれん、 昏睡にいたる）、血糖 降下作用が増強され ることがあるので、 血糖値モニターそ の他患者の状態を十 分に観察し、必要で あれば減量する。	作用機序が異 なる薬理作用 の相加作用に よる血糖降下 作用の増強に よる。
(現行どおり)		(現行どおり)	(略)		(略)
(現行どおり)			(略)		

*改訂内容につきましては DSU No.242 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ 新たな作用機序による血糖降下剤である SGLT2 阻害剤（イプラグリフロジン L-プロリン製剤（販売名「スーグラ錠」）等）が発売されていることから、「相互作用」の「併用注意」の項に追記いたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>

に掲載いたします。