

使用上の注意改訂のお知らせ

広範囲経口抗菌剤

シプロフロキサシン錠 100mg「日医工」

シプロフロキサシン錠 200mg「日医工」

塩酸シプロフロキサシン錠

ニューキノロン系注射用抗菌剤

シプロフロキサシン点滴静注液 200mg「日医工」

シプロフロキサシン点滴静注液 300mg「日医工」

シプロフロキサシン DU 点滴静注液 300mg/250mL「日医工」

シプロフロキサシン注射剤

製造販売元 日医工株式会社

富山市総曲輪 1 丁目 6 番 21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ : 自主改訂)

改 訂 後			現 行		
3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(現行どおり)			(略)		
カフェイン デュロキセチン <u>塩酸塩</u>	<u>これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。</u>	<u>これらの薬剤の肝での代謝を抑制し、クリアランスを減少させるためと考えられている。</u>	カフェイン	カフェインの血中濃度が上昇することがある。	カフェインの肝での代謝を抑制し、クリアランスを減少させるためと考えられている。
(現行どおり)			(略)		

*改訂内容につきましては DSU No.260 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ デュロキセチン塩酸塩製剤（商品名：サインバルタ）において、「シプロフロキサシン」が「併用注意」とされていることから、整合をとるため、本剤においても「デュロキセチン塩酸塩」を「併用注意」といたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。