

日医工の アムロジピン錠/OD錠 を服用される方へ

このお薬は血管を拡げて**血圧を下げる**お薬です。
また、心臓の血管（冠血管）に働いて、**狭心症の発作を予防**します。


▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください**。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、**水なしの場合には寝たまま服用しないでください**。

▶ 服用中の注意点

- めまい、立ちくらみなどがあらわれる場合があります。

高いところでの作業や自動車の運転等危険を伴う機械を操作する場合は十分に注意してください。




- グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。同時に飲むとお薬の作用が強くなるおそれがあります。

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください**。



白目や皮膚
が黄色くなる



鼻血、歯ぐき
からの出血



めまい



尿が赤褐色
になる

だるい

発熱

脈が遅くなる

筋肉の痛み

この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。

▶ 保管に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

日医工の アムロジピン錠/OD錠 を服用される方へ

このお薬は血管を拡げて**血圧を下げる**お薬です。
また、心臓の血管（冠血管）に働いて、**狭心症の発作を予防**します。


▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください**。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、**水なしの場合には寝たまま服用しないでください**。

▶ 服用中の注意点

- めまい、立ちくらみなどがあらわれる場合があります。

高いところでの作業や自動車の運転等危険を伴う機械を操作する場合は十分に注意してください。




- グレープフルーツジュースと一緒に飲まないでください。同時に飲むとお薬の作用が強くなるおそれがあります。

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください**。



白目や皮膚
が黄色くなる



鼻血、歯ぐき
からの出血



めまい



尿が赤褐色
になる

だるい

発熱

脈が遅くなる

筋肉の痛み

この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。

▶ 保管に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。