

## プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される皆様へ

### このお薬を正しく 服用するため、 飲む前に必ず お読みください。



- 必ず主治医の指示通りに服用してください。
- 自分の判断で服用を中止したり、飲む量を減らしたりしないでください。

## プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される皆様へ

### このお薬を正しく 服用するため、 飲む前に必ず お読みください。



- 必ず主治医の指示通りに服用してください。
- 自分の判断で服用を中止したり、飲む量を減らしたりしないでください。

## 服用時の注意事項

- このお薬を飲むと、前兆なく急に眠り込んでしまったり、眠気でぼんやりとしたりすることがありますので、服用中は、車の運転や危険を伴う機械の操作、高い所での作業など危険な作業はしないでください。
- 特に飲みはじめに、めまいや立ちくらみ、ふらつきがみられることがありますので、このような症状があらわれたら主治医に相談してください。
- 飲酒により薬の作用が強くなる場合がありますので、飲酒はなるべく控えてください。

### 以下のような症状があらわれた場合は、 すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 前兆もなく、急に眠り込んでしまう
- 幻覚(実際にはない物が見えたり聞こえたりすると感じる)、錯乱(意識が乱れる)、妄想(根拠のない思い込み)
- めまい、立ちくらみ、ふらつき
- 発熱や意識がぼんやりとする
- 筋肉のこわばり



## 服用時の注意事項

- このお薬を飲むと、前兆なく急に眠り込んでしまったり、眠気でぼんやりとしたりすることがありますので、服用中は、車の運転や危険を伴う機械の操作、高い所での作業など危険な作業はしないでください。
- 特に飲みはじめに、めまいや立ちくらみ、ふらつきがみられることがありますので、このような症状があらわれたら主治医に相談してください。
- 飲酒により薬の作用が強くなる場合がありますので、飲酒はなるべく控えてください。

### 以下のような症状があらわれた場合は、 すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 前兆もなく、急に眠り込んでしまう
- 幻覚(実際にはない物が見えたり聞こえたりすると感じる)、錯乱(意識が乱れる)、妄想(根拠のない思い込み)
- めまい、立ちくらみ、ふらつき
- 発熱や意識がぼんやりとする
- 筋肉のこわばり



## プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される皆様へ

### このお薬を正しく 服用するため、 飲む前に必ず お読みください。



- 必ず主治医の指示通りに服用してください。
- 自分の判断で服用を中止したり、飲む量を減らしたりしないでください。

## プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される皆様へ

### このお薬を正しく 服用するため、 飲む前に必ず お読みください。



- 必ず主治医の指示通りに服用してください。
- 自分の判断で服用を中止したり、飲む量を減らしたりしないでください。

## 服用時の注意事項

- このお薬を飲むと、前兆なく急に眠り込んでしまったり、眠気でぼんやりとしたりすることがありますので、服用中は、車の運転や危険を伴う機械の操作、高い所での作業など危険な作業はしないでください。
- 特に飲みはじめに、めまいや立ちくらみ、ふらつきがみられることがありますので、このような症状があらわれたら主治医に相談してください。
- 飲酒により薬の作用が強くなる場合がありますので、飲酒はなるべく控えてください。

### 以下のような症状があらわれた場合は、 すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 前兆もなく、急に眠り込んでしまう
- 幻覚(実際にはない物が見えたり聞こえたりすると感じる)、錯乱(意識が乱れる)、妄想(根拠のない思い込み)
- めまい、立ちくらみ、ふらつき
- 発熱や意識がぼんやりとする
- 筋肉のこわばり



## 服用時の注意事項

- このお薬を飲むと、前兆なく急に眠り込んでしまったり、眠気でぼんやりとしたりすることがありますので、服用中は、車の運転や危険を伴う機械の操作、高い所での作業など危険な作業はしないでください。
- 特に飲みはじめに、めまいや立ちくらみ、ふらつきがみられることがありますので、このような症状があらわれたら主治医に相談してください。
- 飲酒により薬の作用が強くなる場合がありますので、飲酒はなるべく控えてください。

### 以下のような症状があらわれた場合は、 すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 前兆もなく、急に眠り込んでしまう
- 幻覚(実際にはない物が見えたり聞こえたりすると感じる)、錯乱(意識が乱れる)、妄想(根拠のない思い込み)
- めまい、立ちくらみ、ふらつき
- 発熱や意識がぼんやりとする
- 筋肉のこわばり

