

プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される患者さんへ

このお薬を正しく服用するため、
飲む前に必ずお読みください。



次のような症状が
起こった場合には、
主治医または
薬剤師に
ご相談を！



ドパミン受容体作動薬、レボ
ドパ製剤、COMT 阻害薬を
飲むと、社会的に不利な結果
を招くにもかかわらず、ギャン
ブルや過剰で無計画な買い
物を持続的に繰り返したり、
病的に性欲や食欲が亢進した
りする「**衝動制御障害**（病的
と ばく ひょう でき せい よく こう しん きょう かく せい
賭博、病的性欲亢進、強迫性
ぼう せい びく ぼう せい びく
購買、暴食等）」が起こること
があります。



注意してください！

このお薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り
込んでしまうこと、また、めまいや立ちくらみ、ふらつき、
失神がおこることがあります。車の運転や危険を伴う機
械の操作、高い場所での作業などは行わないでください。
もし、このような症状があらわれた場合にはすぐに主治
医または薬剤師にご相談ください。



プラミペキソール塩酸塩錠「日医工」を 服用される患者さんへ

このお薬を正しく服用するため、
飲む前に必ずお読みください。



次のような症状が
起こった場合には、
主治医または
薬剤師に
ご相談を！



ドパミン受容体作動薬、レボ
ドパ製剤、COMT 阻害薬を
飲むと、社会的に不利な結果
を招くにもかかわらず、ギャン
ブルや過剰で無計画な買い
物を持続的に繰り返したり、
病的に性欲や食欲が亢進した
りする「**衝動制御障害**（病的
と ばく ひょう でき せい よく こう しん きょう かく せい
賭博、病的性欲亢進、強迫性
ぼう せい びく ぼう せい びく
購買、暴食等）」が起こること
があります。



注意してください！

このお薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り
込んでしまうこと、また、めまいや立ちくらみ、ふらつき、
失神がおこることがあります。車の運転や危険を伴う機
械の操作、高い場所での作業などは行わないでください。
もし、このような症状があらわれた場合にはすぐに主治
医または薬剤師にご相談ください。

