

副作用について

- 次の症状に気づいたら、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



● もろろ感



● 記憶が飛ぶ



● 興奮しやすい



● 考えが
まとまらない



● 息苦しい



● 体がだるい

この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



 **日医工株式会社**
NICHIKO

2021年12月作成 N202100234

エスゾピクロン錠 1／2／3mg「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は不眠症を治療するお薬です。

服用する前に必ずお読みください

このお薬は、**漫然と長期に服用を続けると、お薬がないといわれなくなったり、お薬を中止すると手足がふるえて不眠・不安・けいれんなどが起きたりすることがあります。**

必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

エスゾピクロン錠 1mg「日医工」



直径6.1mm 厚さ2.8mm



オモテ

エスゾピクロン錠 2mg「日医工」



直径6.1mm 厚さ2.8mm



ウラ

エスゾピクロン錠 3mg「日医工」



直径6.1mm 厚さ2.8mm



オモテ

ウラ

飲み方について

- 就寝直前に、寝る準備をしてから服用してください。



- 苦みのあるお薬です。服用時は速やかに服用してください。口の中でなめたり、噛んだりしないでください。また、服用した翌朝に口の中に苦みが残る場合があります（味覚異常）。苦みが辛い場合には、医師または薬剤師にご相談ください。



- 睡眠途中で一時的に起床して仕事等で活動する可能性があるときは服用しないでください。



- 自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。



- 飲み忘れに気づいた時は、決して一度に2回分を服用しないでください。



- 誤って多く服用した場合には、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。



- 食事と同時または食直後は服用しないでください。



服用中の注意点

- アルコール飲料は、控えてください。このお薬に影響します。



- 翌朝以降に眠気が残ったり、注意や集中ができなくなることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をしないでください。



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

