

副作用について

- このお薬の服用で、のどの痛みや鼻の奥の違和感・乾燥感、フワフワするようなめまい、頭痛、強い眠気や居眠りがあらわれることがあります。症状が辛い場合には、主治医または薬剤師に相談してください。



● のどの痛み



● 鼻の奥の
違和感・乾燥感



● フワフワする
ようなめまい



● 頭痛



● 強い眠気や
居眠り

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

レベチラセタム錠／ ドライシロップ「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、**てんかんの発作を抑える**目的で
使用されるお薬です。



オモテ

ウラ



オモテ
レベチラセタム錠250mg

ウラ



レベチラセタム
ドライシロップ50%



オモテ

ウラ



オモテ
レベチラセタム錠500mg

ウラ

飲み方について

- **主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。**自己判断で服用を中止したり、服用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しない**でください。

■ 服用中の注意点

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、**自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- 他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



<服用される方へ>

- このお薬の服用で、**攻撃的になる、死にたいという気持ちになるなどの症状があらわれた場合には、ご家族や主治医に相談してください。**

<ご家族の方へ>

- **服用される方から相談があった場合や、攻撃的になったなど症状の変化に気づかれた場合には主治医に相談してください。**

