

レベチラセタム錠／ ドライシロップ「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経の過剰な興奮をはずめて、
てんかん発作を抑える抗てんかん薬です。

■ 服用中の注意点

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、服用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。

<服用される方へ>

- このお薬の服用で、**攻撃的になる、死にたいという気持ちになるなどの症状があらわれた場合には、ご家族や主治医に相談してください。**

<ご家族の方へ>

- 服用される方が、**攻撃的になったなど症状の変化が見られた場合には、主治医に連絡してください。**
- 他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

ウラ面もお読みください →

■ 服用中の注意点(続)

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作を希望する場合は、必ず医師に相談し許可を得てください。**

■ 副作用について

- このお薬の服用で、のどの痛みや鼻の奥の違和感・乾燥感、フワフワするようなめまい、頭痛、強い眠気や居眠りがあらわれることがあります。症状が辛い場合には、主治医または薬剤師に相談してください。



● のどの痛み



● 鼻の奥の
違和感・乾燥感



● フワフワする
ようなめまい



● 頭痛



● 強い眠気や
居眠り

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

レベチラセタム錠／ ドライシロップ「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、脳内の神経の過剰な興奮をはずめて、
てんかん発作を抑える抗てんかん薬です。

■ 服用中の注意点

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、服用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。

<服用される方へ>

- このお薬の服用で、**攻撃的になる、死にたいという気持ちになるなどの症状があらわれた場合には、ご家族や主治医に相談してください。**

<ご家族の方へ>

- 服用される方が、**攻撃的になったなど症状の変化が見られた場合には、主治医に連絡してください。**
- 他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

ウラ面もお読みください →

■ 服用中の注意点(続)

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作を希望する場合は、必ず医師に相談し許可を得てください。**

■ 副作用について

- このお薬の服用で、のどの痛みや鼻の奥の違和感・乾燥感、フワフワするようなめまい、頭痛、強い眠気や居眠りがあらわれることがあります。症状が辛い場合には、主治医または薬剤師に相談してください。



● のどの痛み



● 鼻の奥の
違和感・乾燥感



● フワフワする
ようなめまい



● 頭痛



● 強い眠気や
居眠り

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**