


アトルバスタチン錠「日医工」 アトルバスタチン錠「EE」 を服用される方へ

このお薬は肝臓でのコレステロール合成を抑制することにより、血液中のコレステロールを低下させるお薬です。

アトルバスタチン錠「日医工」



アトルバスタチン錠「EE」



服用する前に


- 以下の方は必ず医師または薬剤師にお伝えください。
 - ・以前にお薬を服用してかゆみ等のアレルギー症状が出たことのある方
 - ・腎臓に病気のある方もしくは過去に病気になった方
 - ・肝臓に病気のある方もしくは過去に病気になった方、アルコール中毒の方
 - ・糖尿病の方
 - ・甲状腺機能低下症の方、筋疾患の方または過去に筋疾患になった方、血縁者に筋疾患の人がいる方
 - ・妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
 - ・他のお薬を服用している方

服用に関する注意点

- 医師の指示なしに、自分の判断で服用を中止したり、お薬の量を変えないでください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- 他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。
- グレープフルーツやグレープフルーツジュースは、このお薬の作用を強めることがあるので避けてください。

ごくまれに下記のような症状があらわれることがあります

次のような症状がみられたら「横紋筋融解症」の可能性がありますので、ただちに服用をやめて、医師または薬剤師に連絡してください。



筋肉の痛み・こわばり、
筋力の低下、手足のしびれ、赤褐色の尿

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の痛みや脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。この流れ出たミオグロビンにより、尿の色が濃く、赤褐色の尿がみられることがあります。また、このミオグロビンにより腎臓が障害を受けることもあります。

その他、次のような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。



吐き気、嘔吐、体がだるい
皮膚や白目が黄色くなる



歯ぐきの出血、皮下出血、
鼻血、血がとまりにくい



発熱、から咳、
息苦しい、息切れ

その他、わからないことや気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。

保管等に関する注意点

- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人（親、姉妹、兄弟、友人など）に絶対に渡さないでください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。