

患者向医薬品ガイド

2022年6月更新

アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」 アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」

【この薬は？】

販売名	アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 Atorvastatin Tablets 5mg	アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」 Atorvastatin Tablets 10mg	アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」 Atorvastatin Tablets 20mg
一般名	アトルバスタチンカルシウム水和物 Atorvastatin Calcium Hydrate		
含有量 (1錠中)	5.42mg (アトルバスタチンとして 5mg)	10.84mg (アトルバスタチンとして 10mg)	21.69mg (アトルバスタチンとして 20mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は高脂血症用剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は肝臓のコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。
- ・次の病気の人処方されます。

**高コレステロール血症
家族性高コレステロール血症**

- この薬は、体調がよくなつたと自己判断して使用を中止したり量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次のは、この薬を使用することはできません。

- 過去にアトルバスタチン錠「日医工」に含まれる成分で過敏症のあった人
- 肝臓の代謝機能が低下していると考えられる以下のような人
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝がん、黄疸
- 妊婦または妊娠している可能性のある人および授乳中の
- グレカプレビル・ピブレンタスピル配合剤を使用している人

○次のは、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- 糖尿病の人
- 横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある以下の人
 - 甲状腺機能低下症の人
 - 遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィーなど）の人、血縁に遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィーなど）の人がいる人
 - 過去に薬剤性の筋障害になった人
 - アルコール中毒の人
- 腎臓に障害のある人、または過去に腎臓に障害があつた人
- 腎臓の機能に関する臨床検査値に異常が認められる人
- 肝臓の代謝機能が低下していると考えられる以下のような人
急性肝炎、慢性肝炎の急性増悪、肝硬変、肝がん、黄疸
- 肝臓に障害のある人、または過去に肝臓に障害があつた人

○この薬には併用してはいけない薬[グレカプレビル・ピブレンタスピル配合剤(マヴィレット配合錠)]や、併用を注意すべき薬や飲食物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

● 使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、以下のとおりです。

[高コレステロール血症に使用する場合]

販売名	アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」
1回量	2錠 (最大4錠)	1錠 (最大2錠)	(最大1錠)
飲む回数	1日1回		

〔家族性高コレステロール血症に使用する場合〕

販売名	アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」
1回量	2錠 (最大8錠)	1錠 (最大4錠)	(最大2錠)
飲む回数	1日1回		

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、気がついたとき、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・使用中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与が中止されます。
- ・劇症肝炎などの肝炎があらわれることがありますので、吐き気、嘔吐（おうと）、体がだるいなどの症状があらわされた場合には使用を中止し、医師に連絡してください。
- ・使用を開始、または使用量が増えた後は、12週までの間に1回以上、それ以後は定期的（半年に1回など）に肝機能検査が行われます。
- ・無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少症があらわれることがあるので、定期的な検査などが行われることがあります。
- ・高血糖、糖尿病があらわれ、喉が渴く、尿量が増える、体がだるいなどの症状があらわれがあるので、定期的な検査などが行われることがあります。
- ・腎臓の機能に関する臨床検査値に異常が認められる人に、フィブラート系薬剤（ベザフィブラーなど）を併用する場合には、急激な腎機能の悪化を伴う横紋筋融解症があらわれがあるので、定期的に腎機能検査などが行われます。筋肉の痛み、脱力感などの症状があらわされた場合には医師または薬剤師に相談してください。
- ・グレープフルーツジュースはこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人および授乳中の人はこの薬を使用することはできません。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる
ミオパチー	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋委縮
免疫介在性壞死性ミオパチー めんえきかいざいせいえいせいいミオパチー	手足のこわばり、手足のしびれ、筋肉の痛み、脱力感、筋力の低下
劇症肝炎 げきしょうかんえん	急な意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
肝炎 かんえん	体がだるい、吐き気、嘔吐、食欲不振、発熱、上腹部痛、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる
肝機能障害 かんきのうしようがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
黄疸 おうだん	白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる
過敏症 かびんしょう	寒気、ふらつき、汗をかく、発熱、意識の低下、口唇周囲のはれ、息苦しい、かゆみ、じんま疹、発疹
無顆粒球症 むかりゅうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み
汎血球減少症 はんけつきゅうげんしょうじょう	めまい、鼻血、耳鳴り、歯ぐきの出血、息切れ、動悸（どうき）、あおあざができる、出血しやすい、発熱、寒気、喉の痛み
血小板減少症 けっしょうばんげんしょうじょう	鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい
中毒性表皮壞死融解症 (TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゅうかいしょう（テン）	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) ひふねんまくがんじょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンじょうこうぐん)	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する

重大な副作用	主な自覚症状
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み
高血糖 こうけつとう	体がだるい、体重が減る、喉が渴く、水を多く飲む、尿量が増える
糖尿病 とうようびょう	体がだるい、体重が減る、喉が渴く、水を多く飲む、尿量が増える
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	脱力感、体がかゆくなる、急激に体重が増える、体がだるい、発熱、疲れやすい、力が入らない、寒気、ふらつき、汗をかく、突然の高熱、出血しやすい、出血が止まりにくい、体重が減る
頭部	急な意識の低下、意識の低下、めまい
顔面	鼻血
眼	白目が黄色くなる、目の充血やただれ
耳	耳鳴り
口や喉	血を吐く、吐き気、嘔吐、口唇周囲のはれ、喉の痛み、歯ぐきの出血、唇や口内のただれ、喉が渴く、水を多く飲む、咳
胸部	息苦しい、息切れ、動悸
腹部	お腹が張る、食欲不振、上腹部痛
手・足	手足のこわばり、手足のしびれ、関節や喉の痛み
皮膚	皮膚が黄色くなる、かゆみ、じんま疹、発疹、あおあざができる、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
筋肉	筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋委縮
便	便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色）
尿	尿が赤褐色になる、尿の色が濃くなる、尿量が増える

【この薬の形は？】

販売名	アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」
形状	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠 	フィルムコーティング錠
直径	5.6mm	6.1mm	7.6mm
厚さ	3.1mm	3.1mm	4.0mm
重さ	72mg	88mg	174.5mg
色	ごくうすい紅色	白色	黄白色
識別コード (本体表示)	アトルバスタチン 5 日医工	アトルバスタチン 10 日医工	アトルバスタチン 20 日医工
識別コード (PTP シート)	(n) 694	(n) 695	(n) 699
PTP シート			

【この薬に含まれているのは？】

販売名	アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 10mg 「日医工」	アトルバスタチン錠 20mg 「日医工」
有効成分	アトルバスタチンカルシウム水和物 5.42mg (アトルバスタチンとして 5mg)	アトルバスタチンカルシウム水和物 10.84mg (アトルバスタチンとして 10mg)	アトルバスタチンカルシウム水和物 21.69mg (アトルバスタチンとして 20mg)
添加物	セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄、その他 1 成分	セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、その他 1 成分	セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ、その他 1 成分

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元：日医工株式会社 (<https://www.nichiiko.co.jp>)

くすりの相談窓口の電話番号 TEL（フリーダイアル）：(0120) 039-215

受付時間：9時～17時（土、日、祝祭日その他当社の休業日を除く）