


ケトコナゾールクリーム2%「NR」 ケトコナゾール外用液2%「NR」 を使用される方へ

このお薬は、カビの一種である「真菌」が原因で起こる皮膚の病気（水虫、カンジダ等）を治療するお薬です。




ケトコナゾール
クリーム2%「NR」



ケトコナゾール
外用液2%「NR」

ケトコナゾール外用液2%「NR」の使い方



押す

キャップをはずし、先端を軽く押し当てた状態で容器を押すと薬液がでできます。使用後はキャップをきちんと閉めてください。頭皮に使用する場合は、薬液を指に適量取って塗布してください。

症状によって用法・用量が異なりますので、医師または薬剤師の指示通りにご使用ください。

	疾患名	回数
✓	はくせん でんぼう 白癬、癬風、皮膚カンジダ症	1日1回塗布
✓	脂漏性皮膚炎	1日2回塗布




以下の方は、お薬を使用する前に医師または薬剤師にご相談ください

- 以前にお薬を使用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことのある方
- 現在授乳中の方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方
- アルコール過敏症の方

ご使用にあたっての注意点

- 使い忘れた場合は、気が付いたときに1回分を塗布してください。
ただし、次に使用する時間が近い場合は、1回とばして次の時間に1回分を塗布してください。決して2回分を一度に使用しないでください。
- 眼には使用しないでください。
誤って入ってしまった場合は水でよく洗い、それでも違和感がある場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ただれた部位や傷のある部位へ使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- ケトコナゾール外用液2%「NR」は合成樹脂（プラスチック等）を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるのでご注意ください。
（液が付着した際にフローリングが溶けたり、メガネの耳かけ部分の色が剥げたりすることがあります）



以下の症状に気が付いたら、医師または薬剤師にご相談ください

ヒリヒリ感、かゆみ、発赤、水疱、じんましん、出血、不快感、乾燥、腫れ など
これら以外にも気になることがございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

保管上の注意点

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
ケトコナゾール外用液2%「NR」は火気も避けてください。
- お薬が残った場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

