

**本資料の情報に関する注意**

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

## 安定性試験

### (無包装状態)

# ビカルタミド OD 錠 80mg 「日医工」

**無包装状態の安定性試験**

ビカルタミド OD 錠 80mg 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、40℃、25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験期間：2015/9/25～2016/1/14

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間		
		開始時	1 ヶ月	3 ヶ月
性状 ＜白色～微黄白色の素錠 (口腔内崩壊錠)＞	508010	白色の素錠であった	白色の素錠であった	白色の素錠であった
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	508010	29～38	31～39	33～35
溶出性 (%) n=6 ＜60 分, 70%以上＞	508010	87.6～88.5	87.4～89.8	85.6～87.3
含量 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	508010	100.1	99.9	100.7
(参考値) 硬度 (N)	508010	97	92	95

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25°C・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間		
		開始時	1 ヶ月	3 ヶ月
性状 ＜白色～微黄白色の素錠 (口腔内崩壊錠)＞	508010	白色の素錠であった	白色の素錠であった	白色の素錠であった
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	508010	29～38	18～24	19～20
溶出性 (%) n=6 ＜60 分, 70%以上＞	508010	87.6～88.5	83.8～86.3	82.8～84.7
含量 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	508010	100.1	100.2	100.3
(参考値) 硬度 (N)	508010	97	51	52

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 室温・曝光量 120 万 Lx・hr [D65 光源(1,000Lx)・シャーレをラップで覆う]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間		
		開始時	60 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状 ＜白色～微黄白色の素錠 (口腔内崩壊錠)＞	508010	白色の素錠であった	白色の素錠であった	白色の素錠であった
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	508010	29～38	34～39	32～35
溶出性 (%) n=6 ＜60 分, 70%以上＞	508010	87.6～88.5	87.2～88.6	87.1～88.8
含量 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	508010	100.1	99.4	100.2
(参考値) 硬度 (N)	508010	97	96	91

※：表示量に対する含有率 (%)