

アジスロマイシン錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は抗生物質です。感染症の原因となる細菌の増殖を抑える作用があります。

必ず医師・歯科医師または薬剤師の指示通りに服用してください。

服用する前に

次の方は医師・歯科医師または薬剤師にご相談ください。

- 以前にお薬を服用してかゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 心臓に病気のある方
- 肝臓に病気のある方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方
- 授乳中の方

服用方法

次のいずれか指示された飲み方で服用してください。

1日1回2錠(250mg錠の場合)または1日1回1錠(500mg錠の場合)を3日間服用してください。約7日間薬の作用が持続します。

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
<input type="checkbox"/> 250mg							
<input type="checkbox"/> 500mg							
作用が持続							

1日1回4錠(250mg錠の場合)または1日1回2錠(500mg錠の場合)を1日服用してください。約10日間薬の作用が持続します。

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
<input type="checkbox"/> 250mg	   									
<input type="checkbox"/> 500mg	 									
作用が持続										

- 自己判断で服用を中止したり、お薬の量を減らしたりしないでください。
- 飲み忘れに気付いたときは、すぐに1回分を服用してください。次に服用する時間が近い場合は、1回とばして、次の時間に1回分服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、音や声が聞こえにくい、耳鳴り、腹痛や下痢などの症状があらわれる場合があります。これらの症状があらわれた場合はすぐに受診してください。

服用中の注意

- 服用後（3日間服用した場合は4日目以降、1日で服用した場合は1週間以降）に症状の改善が見られないときには、医師・歯科医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬を服用後に意識がもうろうとしたり気を失うことがありますので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合は十分に注意してください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師・歯科医師または薬剤師にお伝えください。

副作用の注意

冷や汗、顔面蒼白、息苦しい、脈がふれない、発疹、口内や唇・眼などの粘膜にただれや水ぶくれなどの症状があらわれた場合には**服用を中止し、ただちに医師・歯科医師または薬剤師に連絡してください。**



- 以下の症状があらわれた場合は、ただちに医師・歯科医師または薬剤師にご相談ください。

尿の色が赤褐色になる、手足のこわばり、便に血が混じる、腹痛、下痢、からだのだるい、発熱、から咳、白目が黄色くなる、動悸、青あざができる

これら以外にも気になる症状やわからないことがありましたら、医師・歯科医師または薬剤師にご相談ください。

保管等に関する注意

- 直射日光・高温多湿を避けて、室温で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。ほかの人に渡さないでください。

