

メトトレキサート錠「日医工」 を服用される方へ

このお薬は、1週間のうちに**決められた日**に**決められた量（錠数）**を服用する関節リウマチや局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症状を伴う若年性特発性関節炎のお薬です。

あなたの服用方法

毎週同じ曜日に服用し、服用する錠数も主治医や薬剤師の指示を守ってください。
2～3回に分けて服用する場合は、12時間間隔で服用してください。

1週間に**1回**服用する場合

<input type="checkbox"/>	1日目		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	朝	夕	朝	夕					

1週間に**2回**服用する場合

<input type="checkbox"/>	1日目		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	朝	夕	朝	夕					

1週間に**3回**服用する場合


<input type="checkbox"/>	1日目		2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	朝	夕	朝	夕					

メトトレキサート錠2mg「日医工」

1週間のうち、決められた日だけに服用



® 886





1週間のうち、お薬を飲まない期間を必要としますので服用時には注意してください。

- 飲み間違いを防ぐため、お薬のシートに指示された服用日と曜日を記入し、朝・夕のどちらかに○印をつけてください。
- お薬を飲み忘れた場合は、忘れた分は服用せず、次の決められた時間に次のお薬を服用してください。
- 絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

次の方は主治医または薬剤師にご相談ください

- 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方または妊娠を希望される方
- 以前にお薬を服用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状がでたことのある方
- 血液やリンパ系の病気の方、結核や肋膜炎の病気の方、または過去に患ったことがある方
- 肝臓、腎臓の病気がある方、感染症や水痘（みずぼうそう）にかかっている方
- ワクチンの接種を予定している方、他のお薬を服用中の方


服用中の注意点

- お薬の効果が出るまでに1～2カ月かかる場合があります。「効果がない」または「症状が治まっている」などの理由から、自己判断で服用を中止したり、お薬の量を増やしたり減らしたりしないでください。
- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。
- お薬の服用中は女性は妊娠を避けてください。男性はパートナーの方が妊娠しないように注意してください。
- 生ワクチンの接種は避けてください。
- このお薬の服用中は、なるべくお酒を控えてください。
- 主治医の指示に従って定期的に検査を受けてください。

副作用の注意点

次のような症状に気づいたら、服用を中止し、直ちに主治医または薬剤師に相談してください

◆ 風邪のような症状

発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなど

◆ 皮膚の症状

発疹、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、青あざ、皮下出血

◆ からだ全体の症状

からだがむくんだ、疲れやすい、尿の量や回数が急に減った、下痢、お腹が痛む、吐き気、下痢、食欲がない

◆ その他

口内炎、鼻血や歯ぐきの出血、皮膚や白目が黄色くなる

他にも何か気になることがあれば、主治医または薬剤師に相談してください。