

使用上の注意改訂のお知らせ

免疫抑制剤

タクロリムス錠 0.5mg 「日医工」

タクロリムス錠 1mg 「日医工」

タクロリムス錠 5mg 「日医工」

タクロリムス水和物錠

製造販売元 日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容> (_____ : 自主改訂, _____ : 削除)

新			旧		
(2) 併用注意(併用に注意すること)			(2) 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
テラプレビル	(省略)	(省略)	テラプレビル	(省略)	(省略)
グラゾプレビル <u>レテルモビル</u>	本剤の血中濃度が上昇し、腎障害等の副作用が発現することがある。本剤血中濃度のモニターを行い、必要に応じ減量・休薬等の処置を行う。	CYP3A 阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。	グラゾプレビル	本剤の血中濃度が上昇し、腎障害等の副作用が発現することがある。本剤血中濃度のモニターを行い、必要に応じ減量・休薬等の処置を行う。	<u>グラゾプレビル</u> の CYP3A 阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。
オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル	(省略)	(省略)	オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル	(省略)	(省略)
(他の項 省略)			(他の項 省略)		

<改訂理由>

- レテルモビル製剤の使用上の注意においてタクロリムス製剤との併用に関し、併用注意と記載されていることから、本剤についても同様にレテルモビル製剤との併用に関し、併用注意とする使用上の注意の改訂を行うこととしました。

今回の【使用上の注意】の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.280」(2019年6月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載いたします。